

## Keglesnit på livmoderhalsen - hvorfor skal jeg have et keglesnit?

Du er anbefalet et keglesnit, fordi du har celleforandringer på livmoderhalsen. Celleforandringer er IKKE kræft, men forstadier, der kan udvikle sig til livmoderhalskræft, hvis ikke du bliver opereret. Ved keglesnitsoperationen fjernes det lille område af livmoderhalsen hvor celleforandringerne sidder.

---



### Hvorfor har jeg celleforandringer på livmoderhalsen?

Celleforandringer, også kaldet dysplasi, skyldes seksuel smitte med HPV-virus. Celleforandringer opdeles i lette, moderate og svære forandringer, og blev påvist ved den KBC-celle og vævsprøve, du allerede har fået foretaget i vores klinik.

### Hvordan foretages et keglesnit?

Et keglesnit foretages i lokalbedøvelse. Indgrebet foregår gennem skeden, mens du ligger på et gynækologisk leje. Lægen lægger lokalbedøvelse omkring livmoderhalsen. Det første stik vil du kunne mærke, men ellers vil du ikke kunne føle smerte. Du vil dog hele tiden kunne mærke, at der bliver rørt ved dig, men smertesansen er bedøvet.

Når bedøvelsen virker, udkæres et lille kegleformet vævsstykke fra livmoderhalsen med en elektrisk slynge. Dette tager ca. 10 sekunder. Herefter stoppes eventuel blødning med varme på sårfladen. Hele indgrebet tager cirka 15 minutter. Vævet bliver efter operationen sendt til mikroskopisk undersøgelse. Her undersøges det, om forandringerne er fjernet helt. Der kan gå 2-4 uger før resultatet foreligger.



### Før indgrebet

Du skal lade vandet i klinikken inden indgrebet, så din blære er helt tom. Du skal tage smertestillende, hjemmefra, fx 2 Panodil og 400 mg Ibuprofen. Det er VIGTIGT at du ikke smører dig med bodylotion på dit lår den dag, du skal opereres, da du skal have påsat en lille gelepude på låret.

### Efter indgrebet

For at være sikker på, du ikke bløder for meget skal du i venteværelset 20 minutter efter operationen. Det er en god ide at aftale om, du bliver hentet af en pårørende. Cykling fra klinikken frarådes. Der kan være småblødninger eller brunligt, vandigt, udflåd fra skeden i op til 14 dage efter operationen. Der kan også komme en ny blødning 10-21 dage efter operationen når sårskorpen på livmoderhalsen løsnes og afstødes.

## **Skal jeg være sygemeldt?**

Efter indgrebet, skal du tage det roligt.

1. Du bør være sygemeldt 2-3 dage.
2. Du må ikke løfte over 2 kg.
3. Kontakt os, egen læge eller vagtlæge hvis du får feber, kraftig blødning, smerter eller lugtende udflåd.

For at forebygge infektion FRARÅDES samleje, anvendelse af tamponer, svømme- og karbad i 1 måned.

### **Efterkontrol**

Du vil indenfor 2-4 uger modtage en mail med mikroskopisvar om sværhedsgraden af celleforandringerne og om de er fjernet i sundt væv. Der vil blive planlagt en opfølgende kontrol 6 måneder efter indgrebet.

Speciallægerne i gynækologi

Charlotte Floridon, Ph.d. og Charlotte Søgaard, Ph.d.

Gynækologisk Klinik Holbæk

*Oprettet 20/11-2021, redigeret 1/12-2022, redigeres igen 1/9-2025.*